



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИММУНОКИНД

Регистрационный номер ЛП-001893

Торговое наименование препарата Иммунокинд

Международное непатентованное или группировочное наименование ~

Лекарственная форма таблетки для рассасывания гомеопатические для детей.

Состав

В одной таблетке содержится:

активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20,00 мг, Calcium fluoratum D6 20,00 мг, Calcium phosphoricum D6 20,00 мг, Sulfur iodatum D12 20,00 мг.

Активный компонент получен методом твердофазного потенцирования с использованием лактозы моногидрата.

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 14,85 мг, тальк - 5,00 мг, магния стеарат - 0,15 мг.

Описание

Круглые таблетки белого или почти белого цвета, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Профилактика ОРВИ, ускорение процессов выздоровления и повышение сопротивляемости организма к респираторным инфекциям у часто болеющих детей в возрасте до 6 лет.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

- пациенты с сахарным диабетом;
- детский возраст до 3 лет;
- пациенты с заболеванием щитовидной железы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо. Данное лекарственное средство предназначено для применения у детей.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Иммунокинд следует принимать следующим образом:

дети от 0 до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей до 3-х лет таблетку следует тщательно измельчить в 5 мл (1 чайная ложка) воды и полученную суспензию дать ребенку выпить. Максимальный курс лечения препаратом составляет 3 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные





эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны.

Если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие медикаменты, в том числе и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом Вашему врачу. Не следует принимать препарат вместе с пищей и напитками. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат применяют по назначению врача. Не давайте ребенку двойную дозу, если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (6 таблеток) соответствует 0,041 хлебной единицы (ХЕ). Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата у детей грудного и младшего возраста (до 3 лет).

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 3 дней или ухудшаются, следует немедленно обратиться к врачу! Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не применимо. Данное лекарственное средство предназначено для применения у детей.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей. По 150 таблеток во флакон из коричневого стекла с пластмассовой закручивающейся крышкой, с контролем первого вскрытия. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмБХ & Ко. КГ, Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Производитель:

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмБХ & Ко. КГ, Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6; тел. +7(495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com; интернет-сайт: www.alpenpharma.ru